

Informatie voor de gebruiker

Neurobion®

### **Naam en samenstelling**

Neurobion bevat per ml als werkzame bestanddelen vitamine B 1 (thiaminehydro-chloride) 33 milligram, vitamine B 6 (pyridoxinehydrochloride) 33 milligram en vitamine B 12 (cyanocobalamine) 333 microgram. Als hulpstoffen bevat de oplossing kaliumcyanide, benzylalcohol, natriumhydroxide en water voor injectie. Een ampul bevat 3 ml oplossing.

Neurobion wordt in Nederland in de handel gebracht door Merck BV te Amsterdam en is in het register ingeschreven onder het nummer RVG 00531.

### **Indicatie**

Aandoeningen waarbij een tekort aan vitamine B 1 , vitamine B 6 en vitamine B 12 bestaat.

### **Wanneer Neurobion niet gebruiken?**

Neurobion dient niet te worden gebruikt door patiënten met een overgevoeligheid voor één van de bestanddelen. Evenmin bij deficiënties waarbij de aard en oorzaak niet bekend zijn en niet door patiënten met de ziekte van Parkinson die alleen behandeld wordt met levodopa. Verder niet bij voortijdig geboren baby's en kinderen tot 3 jaar in verband met de hulpstof benzylalcohol.

### **Voorzorgsmaatregelen**

Bij bloedarmoede tengevolge van vitamine B 12 tekort mag vitamine B 12 (cyanocobalamine) niet worden gecombineerd met foliumzuur.

### **Gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding**

Neurobion kan in de aanbevolen dosering gebruikt worden tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. Neurobion bevat de hulpstof benzylalcohol. Benzylalcohol kan een negatief effect hebben op te vroeg geboren baby's als Neurobion wordt gebruikt vlak voor of tijdens de bevalling of keizersnede.

### **Wisselwerking met andere geneesmiddelen**

Vitamine B 6 (pyridoxinehydrochloride) vermindert de werking van levodopa. De volgende geneesmiddelen verminderen de werking van vitamine B 6: isoniazide, hydralazine, penicillamine en cycloserine.

### **Dosering en wijze van gebruik**

Neurobion is bestemd voor injectie in spieren. Bij voorkeur wordt het handwarm en langzaam diep in de bilspier ingespoten. In ernstige gevallen geve men dagelijks 1 ampul tot de acute symptomen zijn verdwenen.

Voor nabehandeling is 2-3 maal per week 1 ampul voldoende, welke dosering in minder ernstige gevallen soms reeds vanaf het begin toereikend kan zijn.

**Bijwerkingen**

In zeldzame gevallen kunnen overgevoelighedsreacties optreden. Verder kunnen patiënten die behandeld worden met Neurobion last krijgen van transpiratie, versnelde hartslag en huidreacties, zoals jeuk en netelroos. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

**Wijze van bewaring en houdbaarheid**

Neurobion dient beneden 25°C bewaard te worden. Bewaar Neurobion niet in de koelkast of vriezer. Niet gebruiken na de aangegeven datum (Exp. betekent niet te gebruiken na de aangegeven datum).

Juni 2001