

Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Vermox al eerder heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

TRADEMARK

Vermox
tabletten 100 mg

Dit geneesmiddel wordt in de handel gebracht door:



Wat zijn Vermox-tabletten?

Vermox-tabletten zijn lichtoranje, ronde tabletten met een sinaasappelsmaak. De tabletten hebben een breuklijntje, waardoor ze gemakkelijk in tweeën gedeeld kunnen worden. Op de ene kant van de tabletten staat 'Me 100'. Op de andere kant van de tabletten staat 'Janssen'.

Elke Vermox-tablet bevat 100 mg mebendazol. Mebendazol is de stof die zorgt voor de werking van Vermox-tabletten. Mebendazol is een stof die verschillende soorten wormen doodt. Verder bevatten Vermox-tabletten hulpstoffen: microkristallijne cellulose (E 460), natriumzetmeelglycolaat, talk, maïszetmeel, saccharoïde-natrium, magnesiumstearaat, gehydrogeneerde plantaardige olie, colloïdaal watervrij silica, natriumlaurylsulfaat, sinaasappelsmaakstof en oranjegeel S (E110).

Vermox-tabletten zijn verpakt in een doosje met 6 tabletten in een strip.

Vermox tabletten 100 mg zijn in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 06513 op naam van Janssen-Cilag B.V., Postbus 90240, 5000 LT Tilburg.

Wanneer gebruikt u Vermox-tabletten?

U heeft Vermox gekregen omdat u last heeft van een worminfectie. Vermox is werkzaam tegen verschillende soorten wormen: aarsmaden ('wormpjes'), spoelwormen, zweepwormen, mijnwormen en lintwormen. Uw arts heeft u misschien wel verteld wat voor een soort worminfectie u heeft.

Wanneer mag u Vermox NIET gebruiken?

U mag Vermox niet gebruiken wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de tabletten. Welke dit zijn, vindt u onder 'Wat zijn Vermox-tabletten?'. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, bultjes op de huid of vochtophoping rondom de mond, vooral lippen, keel en tong. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Vermox en raadpleeg uw arts.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Welke voorzorgen moet u nemen voordat u Vermox gaat gebruiken?

• **Zwangerschap**

Er is nog weinig over bekend of gebruik van Vermox tijdens de zwangerschap veilig is. Uit proeven met dieren is gebleken dat Vermox schadelijk kan zijn. Daarom mag u Vermox niet gebruiken als u zwanger bent of als u van plan bent om gedurende de periode van behandeling in verwachting te raken, behalve wanneer uw arts anders beslist. Overleg hierover met uw arts.

• **Borstvoeding**

Het is niet bekend of de stof die zorgt voor de werking van Vermox in de moedermelk terechtkomt. Overleg daarom met uw arts of u Vermox mag gebruiken als u borstvoeding geeft.

• **Kinderen jonger dan 2 jaar**

Bij kinderen jonger dan 2 jaar is er nog niet veel ervaring met het gebruik van Vermox. Daarom wordt Vermox niet altijd gegeven aan kinderen die jonger zijn dan 2 jaar.

- **Deelname aan het verkeer, bedienen van machines**

Het is niet waarschijnlijk dat Vermox uw reactievermogen nadelig beïnvloedt. Daarom kunt u gewoon deelnemen aan het verkeer of gevaarlijke machines bedienen wanneer u Vermox gebruikt.

Andere geneesmiddelen en Vermox

Als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, dan kunt u Vermox zonder bezwaar tegelijkertijd met andere geneesmiddelen gebruiken.

Middelen die cimetidine bevatten, dit zijn bepaalde middelen tegen te veel maagzuur, kunnen de werking van Vermox versterken wanneer u Vermox gedurende een lange tijd in grotere hoeveelheden inneemt dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Overleg hierover met uw arts.

Waarschuwing

Heeft u Vermox volgens het voorschrift van uw arts gebruikt, maar is de worminfectie bij u nog niet over? Neem dan contact op met uw arts.

Hoeveel Vermox moet u innemen?

Uw arts heeft u wellicht verteld hoeveel Vermox u moet innemen. Houd u altijd aan dit voorschrift. Maak de kuur altijd helemaal af (maak de voorgeschreven hoeveelheid helemaal op). Als u dit niet doet, dan heeft u kans dat de infectie niet helemaal weg gaat.

De hoeveelheid Vermox die u in moet nemen hangt af van het soort worm waarmee u geïnfecteerd bent. In het algemeen zijn de regels als volgt.

- **Volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar**

Aarsmaden ('wormpjes')

De dosis is één tablet. Na 14 dagen moet opnieuw één tablet ingenomen worden. Dit is nodig om helemaal van de infectie af te komen. Als uw arts het nodig vindt, dan kan het zijn dat u iedere 14 dagen één tablet in moet nemen.

Spoelwormen, zweepwormen en mijnwormen

De dosering is meestal één tablet 's ochtends en één tablet 's avonds gedurende 3 opeenvolgende dagen. Als de infectie 3 weken na de kuur nog niet helemaal over is, dan moet de kuur herhaald worden.

Lintwormen

De dosering is meestal 3 tabletten 's ochtends en 3 tabletten 's avonds, gedurende 3 opeenvolgende dagen.

- **Kinderen jonger dan 2 jaar**

Er is nog niet veel ervaring met het gebruik van Vermox bij kinderen jonger dan 2 jaar. Daarom wordt Vermox niet altijd gegeven aan kinderen die jonger zijn dan 2 jaar.

Hoe moet u Vermox innemen?

U kunt de tabletten kauwen of heel doorslikken met een paar slokken water of een andere drinkbare vloeistof. U kunt Vermox-tabletten tijdens de maaltijd of tussen twee maaltijden door innemen.

Wat moet u doen bij overdosering?

Overdosering betekent dat u meer Vermox heeft ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven, of dat iemand in uw omgeving uw Vermox heeft ingenomen. Raadpleeg in deze gevallen een arts. De verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden zijn maag-darmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, overgeven en diarree.

Bij overdosering kunt u altijd geactiveerde kool (verkrijgbaar bij de apotheek) innemen. Geactiveerde kool neemt de Vermox op die nog in de maag aanwezig is en die nog niet door het lichaam is opgenomen.

Mogelijke bijwerkingen door gebruik van Vermox

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. Van Vermox zijn de volgende bijwerkingen bekend.

- Het kan zijn dat u overgevoelig bent voor Vermox. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, bultjes op de huid of vochtophoping rondom de mond, vooral lippen, keel en tong. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Vermox en raadpleeg uw arts.

- Soms kan Vermox buikpijn of diarree veroorzaken. Maar deze verschijnselen kunnen ook veroorzaakt worden door de worminfectie zelf.
- Heel zelden kunnen koorts of huidaandoeningen voorkomen. Raadpleeg uw arts als een van deze verschijnselen zich voordoet.
- Bij baby's is er een hele kleine kans op stuip trekkingen. Neem contact op met uw arts als dit bij uw baby optreedt.
- Wanneer u Vermox gedurende een lange tijd in grotere hoeveelheden inneemt dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing, dan kunnen nier- en leveraandoeningen optreden.

Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

Hoe bewaart u Vermox-tabletten?

Bewaar de Vermox-tabletten steeds in de verpakking die u van de apotheek heeft gekregen, met deze gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen. De juiste manier om Vermox-tabletten te bewaren is: bij kamertemperatuur (tussen 15 en 25 °C) en buiten het bereik van kinderen.

Hoe lang zijn Vermox-tabletten houdbaar?

Als u Vermox-tabletten op de juiste manier bewaart, zijn ze houdbaar tot de datum die op het doosje en/of op de strip staat. Bijvoorbeeld: *niet gebruiken na 08-01* of *EXP.: 08-01* betekent dat u het geneesmiddel na augustus 2001 niet meer mag gebruiken. Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in juli 1997.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...

Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.

Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?

- *Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.*
- *Gebruik het alleen in de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid.*
- *Gebruik het niet langer dan is aangegeven door uw arts.*

Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.

Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.

Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.

Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.

verm.b/sdu97/07/30